

提出用

黒大豆枝豆栽培履歴(黒豆の枝豆街道マップ事業2021用)

* 黒豆の枝豆の直売所の情報を提出いただくのに際し、適性に栽培がされていることを確認するために栽培履歴を提出いただくものです。栽培履歴の内容は公開しません。

住 所

氏 名

印

面 積

a

① 栽培の履歴		② 元肥の使用状況				③ 追肥の使用状況				④ 出荷販売先	
は 種	月 日	元肥 10a/kg	月	日	kg	追肥 10a/kg	月	日	kg	直 売	
移 植	月 日		月	日	kg		月	日	kg	朝 市	
中耕・培土	月 日		月	日	kg		月	日	kg	そ の 他 ()	
収穫始	月 日		月	日	kg		月	日	kg	※該当するものに○	
収穫終	月 日		月	日	kg		月	日	kg		

⑤ 農薬の使用状況

種別	農薬名	農薬使用基準		農薬使用実績					※参考		
		希釈倍率	使用時期	月	月	月	月	月	※参考	対象病害虫	備考
		使用量	使用回数	日	日	日	日	日	日	対象病害虫	備考
病他	キヒゲンR-2フロアブル	1kg当たり原液 20ml	は種前							紫斑病・苗立枯病・タネバエ・カラス・ハト	塗沫処理
			1回								
病他	クルーザーMAXX	1kg当たり原液 8ml	は種前							アブラムシ類・タネバエ・ネキリムシ類・フタスジヒメハムシ・茎疫病・リゾクトニア根腐病・苗立枯病(ピシウム菌)・紫斑病・黒根腐病	塗沫処理
			1回								
虫	カルホス微粒剤F	6kg/10a	は種時又は定植時 1回							タネバエ・ネキリムシ類	土壤表面散布 土壤混和処理
虫	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	収穫30日前まで 4回以内							マメシンクイガ・カメムシ類・シロイチモジマダラメイガ・ダイズサヤタマバエ・フタスジヒメハムシ	散布
虫	アグロスリン乳剤	2000倍	収穫7日前まで							カメムシ類・フタスジヒメハムシ・マメシンクイガ	散布
		100~300L/10a	3回以内								
虫	トレボン乳剤	1000倍	収穫14日前まで							カメムシ類・フタスジヒメハムシ・ハスモンヨトウ・マメシンクイガ・ダイズサヤタマバエ・ウコンノメイガ	散布
		100~300L/10a	2回以内								
虫	プレバソンプロアブル5	4000倍	収穫3日前まで							ウコンノメイガ・マメシンクイガ・ハスモンヨトウ	散布
		100~300L/10a	3回以内								
虫	ダニトロンプロアブル	1000~2000倍 150~300L/10a	収穫7日前まで 1回							ハダニ類	散布
種別	農薬名	農薬使用基準		農薬使用実績					※参考		
		薬量	使用時期	月	月	月	月	月	※参考	対象病害虫	備考
		希釈水量	使用回数	日	日	日	日	日	日	対象病害虫	備考
除草	バスタ液剤	300~500ml/10a	は種前・は種後出芽前・定植5日前まで(雑草生育期) 収穫28日前まで(株間処理:本葉5葉期以降雑草生育期)						一年生雑草		雑草茎葉散布
			収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期)								
除草	ポルトプロアブル	200~300ml /10a 100L/10a	耕起前又は出芽前までのイネ科雑草の3~10葉期但し、収穫30日前まで						一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		雑草茎葉散布
				1回							
除草	ラウンドアップマックスロード	200~500ml /10a 50~100L/10a	耕起前又は出芽前までのイネ科雑草の3~10葉期但し、収穫30日前まで						一年生雑草		雑草茎葉散布
				3回以内							