

# 記入例

## 黒大豆枝豆栽培履歴(黒豆の枝豆街道マップ2025用)

※8月29日までにご提出ください。

※ 黒豆の枝豆の直売所の情報を提出いただくのに際し、適性に栽培がされていることを確認するために栽培履歴を提出いただくものです。栽培履歴の内容は公開しません。

住所 **京丹波町須知色紙田1番地1**  
 氏名 **京丹波 太郎**  
 面積 **100** a

| ① 栽培の履歴 |        | ② 元肥の使用状況 |        |            |    | ③ 追肥の使用状況 |    |    |    | ④ 出荷販売先   |
|---------|--------|-----------|--------|------------|----|-----------|----|----|----|-----------|
| は種      | 6月10日  | 元肥        | 3月20日  | 堆肥 2000 kg | 追肥 | 月         | 日  | kg | 直売 |           |
| 移植      | 月 日    |           | 6月5日   | 豆蔵 40 kg   |    | 月         | 日  | kg | 朝市 |           |
| 中耕・培土   | 7月13日  |           | 月      | 日          |    | kg        | 月  | 日  | kg | その他( )    |
| 収穫始     | 10月10日 |           | 月      | 日          |    | kg        | 月  | 日  | kg | ※該当するものに○ |
| 収穫終     | 10月20日 |           | 10a/kg | 月          |    | 日         | kg | 月  | 日  |           |

### ⑤ 農薬の使用状況

| 種別 | 農薬名          | 農薬使用基準                     |                  | 農薬使用実績 |      |   |   |   | ※参考   |               |
|----|--------------|----------------------------|------------------|--------|------|---|---|---|---|---------------|
|    |              | 希釈倍率                       | 使用時期             | 月      | 月    | 月 | 月 | 月 | 対象病虫害   | 備考            |
|    |              | 使用量                        | 使用回数             | 日      | 日    | 日 | 日 | 日 |   |               |
| 病他 | キヒゲンR-2フロアブル | 1kg当たり原液<br>20ml           | は種前<br>1回        |        |      |   |   |   | 紫斑病・苗立枯病・タネバエ・カラス・ハト  | 塗沫処理          |
| 病他 | クルーザーMAXX    | 1kg当たり原液<br>8ml            | は種前<br>1回        | 6/10   |      |   |   |   | アブラムシ類・タネバエ・ネキリムシ類・フタスジヒメハムシ・茎疫病・リゾクトニア根腐病・苗立枯病(ピシウム菌)・紫斑病・黒根腐病 | 塗沫処理          |
| 虫  | カルホス微粒剤F     | 6kg/10a                    | は種時又は定植時<br>1回   |        |      |   |   |   | タネバエ・ネキリムシ類   | 土壌表面散布 土壌混和处理 |
| 虫  | ダイアジノン粒剤5    | 4~6kg/10a                  | 収穫30日前まで<br>4回以内 |        |      |   |   |   | マメシクイガ・カメムシ類・シロイチモジマダラメイガ・ダイズサヤタマバエ・フタスジヒメハムシ                   | 散布            |
| 虫  | アグロスリン乳剤     | 2000倍<br>100~300L/10a      | 収穫7日前まで<br>3回以内  | 7/15   | 8/1  |   |   |   | カメムシ類・フタスジヒメハムシ・マメシクイガ  | 散布            |
| 虫  | トレボン乳剤       | 1000倍<br>100~300L/10a      | 収穫14日前まで<br>2回以内 | 8/30   | 9/20 |   |   |   | カメムシ類・フタスジヒメハムシ<br>・ハスモンヨトウ・マメシクイガ・ダイズサヤタマバエ<br>・ウコンノメイガ        | 散布            |
| 虫  | プレバソンフロアブル5  | 4000倍<br>100~300L/10a      | 収穫3日前まで<br>3回以内  |        |      |   |   |   | ウコンノメイガ・マメシクイガ・ハスモンヨトウ  | 散布            |
| 虫  | ダニトロンフロアブル   | 1000~2000倍<br>150~300L/10a | 収穫7日前まで<br>1回    |        |      |   |   |   | ハダニ類  | 散布            |

| 種別 | 農薬名            | 農薬使用基準        |  | 農薬使用実績 |   |   |   |   | ※参考                   |        |
|----|----------------|---------------|--|--------|---|---|---|---|-----------------------|--------|
|    |                | 薬量            | 使用時期   | 月      | 月 | 月 | 月 | 月 | 対象病虫害                 | 備考     |
|    |                | 希釈水量          | 使用回数   | 日      | 日 | 日 | 日 | 日 |                       |        |
| 除草 | バスタ液剤          | 300~500ml/10a | は種前・は種後出芽前・定植5日前まで(雑草生育期)<br>収穫28日前まで(株間処理:本葉5葉期以降雑草生育期) |        |   |   |   |   | 一年生雑草                 | 雑草茎葉散布 |
|    |                | 100~150L/10a  | 収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期)<br>3回以内                             |        |   |   |   |   |                       |        |
| 除草 | ポルトフロアブル       | 200~300ml/10a | 雑草生育期「イネ科雑草の3~10葉期」時、収穫30日前まで                            |        |   |   |   |   | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草茎葉散布 |
|    |                | 100L/10a      | 1回   |        |   |   |   |   |                       |        |
| 除草 | ラウンドアップマックスロード | 200~500ml/10a | 耕起前又は出芽前まで   | 5/20   |   |   |   |   | 一年生雑草                 | 雑草茎葉散布 |
|    |                | 50~100L/10a   | 3回以内   |        |   |   |   |   |                       |        |